

# หยุด!! ภัยร้าย ไข้เลือดออก



ยุงลาย

พาหะนำโรค  
ไข้เลือดออก



คนถูกยุงกัด

ป่วยเป็นโรค  
ไข้เลือดออก



แพร่กระจาย

ยุงมีเชื้อไข้เลือดออก กัดคนอื่น ๆ  
เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก


## กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



ปิดฝาเก็บน้ำ  
ให้มิดชิด



เปลี่ยนถ่ายน้ำ  
ทุกสัปดาห์



ปล่อยปลา  
กินลูกน้ำ



คว่ำวัสดุเหลือใช้  
ไม่ให้น้ำขัง



ปรับปรุง  
สิ่งแวดล้อม



# ไข้เลือดออก

## ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต

### อาการ

ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน  
มีผื่น จุดแดงจ้ำตามลำตัว  
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย  
ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้  
อาเจียน เบื่ออาหาร

หากมีอาการดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์



### คำเตือน!



\*\*\*อย่าซื้อยากินเอง\*\*\*

โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs  
เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน  
หรือ ไดโคลฟีแนค



### การป้องกัน



#### เก็บบ้าน

ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก



#### เก็บขยะ

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



#### เก็บน้ำ

ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่